


Ueber die Sulfonierung einseitig positivierter Aethylene.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

genehmigt von der

Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Von

Herbert Günther

aus

Wuppertal-Elberfeld.

Bonn 1937
Anton Brand.

Berichterstatter: Prof. Dr. R. Wizinger

Prof. Dr. Dr. Ing. E. h. P. Pfeiffer.



Die vorliegende Arbeit wurde auf Veranlassung von Herrn Professor Dr. Robert W i z i n g e r im Chemischen Institut der Universität Bonn sowie im chemischen Laboratorium der Höheren Fachschule für Textilindustrie Wuppertal-Barmen ausgeführt.


Meinem hochverehrten Lehrer möchte ich für die stets bereite Unterstützung und das Interesse, mit dem er die Arbeit förderte, auf das herzlichste danken.

Meiner Mutter!


Theoretischer Teil

Umfassende Untersuchungen über das Wesen des aromatischen Charakters haben R. Wizinger¹⁾ dazu geführt, den Mechanismus der Substitutionsreaktionen weitgehend zu klären. Die wesentlichsten Erkenntnisse aus diesen Arbeiten seien hier kurz wiedergegeben.


Einfach symmetrisch gebaute Olefine addieren Halogenwasserstoff oder Säuren unmittelbar an die ungesättigten C-Atome unter Bildung nichtionoider Verbindungen, die Estercharakter besitzen:



Im Gegensatz zu dieser „koordinativen“ oder „nichtionoiden“ Addition addieren Äthylene, deren ungesättigte C-Atome durch amphotere und positivierende Auxochrome stark positiviert sind, Halogene „ionoid“ unter Bildung mehr oder weniger tieffarbiger Dicarbeniumsalze²⁾




Ist in einem Äthylen nur ein C-Atom positiviert, so ist dieses C-Atom zu ionoider Bindung eines Halogenatoms befähigt, während das andere Halogenatom koordinativ, also nichtionoid an das β -C-Atom angelagert wird:



1) R. Wizinger: Habilitationsschrift Bonn 1927. P. Pfeiffer und R. Wizinger: A. 461, 132 (1928).


2) R. Knipp, Diss. Bonn 1931; daselbst Angabe weiteren Schrifttums.

Unter R und R' sind in dieser Formel positivierende Gruppen in weitestem Sinne, u. a. auch Kombinationen von amphoteren Auxochromen mit positivierenden Auxochromen wie




zu verstehen.

Säuren werden von diesen einseitig positivierten Äthylenen in der Weise addiert, daß das Halogen bzw. der Säurerest ionoid vom α -C-Atom gebunden wird, während der Wasserstoff, d. h. das Proton sich koordinativ, also nichtionoid an das β -C-Atom anlagert:




Die Entstehung solcher Carbeniumsalze wird begünstigt durch die Stärke der Positivierung des α -C-Atoms. Bei mäßig stark positivierten Äthylenen, z. B. beim Dianisyläthylen, ist das Methylcarbeniumsalz nur bei großem Säureüberschuß in größerer Menge vorhanden. Mit Eisessig kann noch keine, mit Salzsäure nur sehr geringe, mit konz. Schwefelsäure schon eine intensiv orangefarbene Halochromie beobachtet werden.




Bei Verdünnung der Säure tritt sofort weitgehender Zerfall in die Komponenten ein. Während bei diesem Äthylen ein Carbeniumsalz in reiner Form nicht gefaßt werden konnte, ist beim Diveratryläthylen das Perchlorat gefaßt. Es ist gegen Wasser und Alkohol sehr unbeständig; seine Lösungsfarbe ist intensiv violettrot³⁾:


3) P. Dreyfuss, Diss. Bonn 1933.



Stärker positivierende Äthylene, wie etwa die technisch wichtige Fischer-Base, bilden schon sehr beständige Carbeniumsalze, bei denen eine Spaltung in die Komponenten nur durch Zusatz säurebindender Mittel gelingt, z. B:




In grundsätzlich gleicher Weise wie HX können sich auch ganz allgemein Verbindungen des Typs AX an einseitig positivierende Äthylene anlagern:



R und R' bedeuten positivierende Gruppen, R'' ist ein beliebiger Substituent; A ist eine Gruppe, die sich nichtionoid an das β -C-Atom addieren kann und X eine Gruppe oder ein Atom, das in ein negatives Ion überzugehen vermag. AX kann z. B. sein: Cl-Cl, Br-Br, ON-Cl, O₂N-ONO₂, HO₃S-OSO₃H, R-CO-Cl, CH₃-J, C₆H₅-N₂Cl, usw. Es entstehen so Carbeniumsalze mit einem (R'' = H) oder zwei Substituenten in der Methylgruppe.


Analog den Säureadditionsprodukten an einseitig positivierende Äthylene sind auch diese Salze bei mäßig starker Positivierung nur in Gegenwart überschüssiger Säure beständig. Fehlt dieser Überschuss, so tritt hier ebenfalls Säureabsplattung ein. Diesmal bleibt aber nicht das Ausgangsäthylen zurück sondern ein Äthylen, welches am β -C-Atom den Rest A trägt, also ein Substitutionsprodukt. Diese

mäßig stark positivierten Äthylene haben somit völlig aromatischen Charakter:




Es liegt nun klar auf der Hand, daß man die Beständigkeit des Zwischenproduktes durch geeignete Positivierung weitgehend beeinflussen, d. h. abschwächen und verstärken kann. Bei sehr stark positivierten Äthylenen, etwa bei der Fischer-Base (hier sind R und R' durch Ringschluß miteinander verbunden), ist das entsprechende Carbeniumsalz so stabil, daß das Substitutionsprodukt nur durch säureentziehende Mittel erhalten werden kann. Stark positivierte Äthylene haben also den typisch aromatischen Charakter bereits überschritten. Die Reaktion bleibt beim Zwischenprodukt stehen. Den ausgesprochen aromatischen Charakter zeigen also, wie bereits betont, die Äthylene mit mäßig starker Positivierung; diese aber ganz allgemein, unabhängig davon, ob sie Ringstruktur besitzen oder nicht.

Auch das Benzol und seine Derivate gehören zu dieser Körperklasse. Hier sind lediglich R' und R'' miteinander verknüpft, so daß ein Ring entsteht:



Auch hier ist die Bildung des ionoiden Zwischenproduktes unerlässlich, weil erst in diesem der Wasserstoff des β -C-Atoms so beweglich wird, daß selbsttätige Abspaltung von HX erfolgt. Die Substitution am Benzolkern verläuft also nach folgendem Schema:

Beispiel der ortho-Substitution:



Bisher ist es R. W i z i n g e r und Mitarbeitern gelungen, diesen Reaktionsmechanismus für die Halogensubstitution ⁴⁾, die Nitrierung ⁵⁾, die Friedel-Crafts'sche Reaktion ⁶⁾, die Azokupplung ⁷⁾ und die Nitrosierung ⁸⁾, d. h. für die Einwirkung von Cl-Cl, Br-Br, J-J, O₂N-ONO₂, O₂N-C(NO₂)₃, ON-Cl, CH₃J, R-CO-Cl, Pikrylchlorid und Diazoniumsalzen festzustellen.

Die nähere Untersuchung über den Mechanismus der Sulfonierung stand noch aus. Es war die Aufgabe vorliegender Arbeit, diese Lücke auszufüllen; und dies war um so notwendiger, da gerade die Bildung von Sulfosäuren mit Schwefelsäure oder Oleum ein Hauptcharakteristikum für den aromatischen Charakter einer Verbindung ist. —

Beim Behandeln aliphatischer und aromatischer Verbindungen mit denselben Sulfonierungsagenzien gelangt man zu voneinander durchaus verschiedenen Körperklassen.

Während in der aliphatischen Reihe bei den Paraffinen mit Schwefelsäure und Oleum nur in sehr wenigen, besonders gelagerten Fällen eine Reaktion beobachtet werden konnte ⁹⁾, und Sulfosäuren im allgemeinen nur durch die Einwirkung von Alkali- oder Silbersulfit und Halogenalkyl über das Alkali- bzw. Silbersalz der Alkylsulfosäure zugänglich sind, verhalten sich die Olefine mit den aromatischen Verbindungen insofern im Prinzip gleichartig, als bei beiden mit Oleum Sulfonierungsprodukte entstehen, deren Bildungsweisen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können.

Äthylen reagiert mit Schwefelsäure in zwei Richtungen. Bei Anwendung konz. Schwefelsäure und Temperaturen bis 50° wird die Schwefelsäure zu Äthylschwefelsäure addiert:



Dieser Reaktion entspricht bei den einseitig positivierten Äthylenen die Bildung der Methylcarbeniumbisulfate:

4) P. Pfeiffer und R. W i z i n g e r, A. 461, 13 (1928).


5) J. Bulich, Diss. Bonn 1934.

6) M. Coenen, Diss. Bonn 1935.


7) B. Cyriax, Diss. Bonn 1936.

8) K. Messner, Diss. Bonn 1936.


9) R. A. Worstall, Am. 20, 664 (1898).




Bei der Einwirkung von rauchender Schwefelsäure, d. h. von $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ erhält man Äthionsäure, die bei Anwesenheit von überschüssigem SO_3 in Carbylsulfat übergeht: ¹⁰⁾




Nach diesem Befund steht zu erwarten, daß die einseitig positivierten Äthylene mit Oleum Additionsprodukte ergeben, welche sich von der Äthionsäure dadurch unterscheiden, daß sie ionisiert sind:




Bei schwacher Positivierung würde ein solches Produkt unter Abspaltung von HX , d. h. hier von H_2SO_4 , in das Substitutionsprodukt, die Sulfosäure übergehen:




Für die Sulfonierung des Benzols wäre entsprechend folgendes Reaktionsbild vorauszusetzen:



Für die vorliegende Untersuchung wurden folgende Äthylene herangezogen:




10) A. Michael und N. Weiner, C. 1936, II, 3655.




Sämtliche Äthylene lösen sich in konz. Schwefelsäure unter Bildung von Methylcarbeniumsalzen. Daß die beobachteten Halochromieerscheinungen auf diese Methylcarbeniumsalze zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Tatsache, daß beim Eingießen in Eiswasser bzw. bei den stärker positivierten Äthylenen nach der Neutralisation die Äthylene wieder ausfallen.

Wie die folgende kleine Übersicht zeigt, sind die Halochromieerscheinungen mit Oleum z. T. deutlich verschieden. Werden die Lösungen in Oleum nach längerem Stehen in Wasser gegossen bzw. neutralisiert, scheidet sich nichts mehr aus; es hat also Sulfonierung stattgefunden. Die Halochromieerscheinungen dürften demnach durch die ionoiden Zwischenprodukte




bedingt sein. Daß diese tieferfarbig sind als die unsubstituierten Methylcarbeniumsalze, steht in bester Übereinstimmung mit den Beobachtungen an den Zwischenprodukten der Bromierung und Nitrirung:



	Halochromie mit	
	H ₂ SO ₄ (96%ig)	Oleum (ca. 20%ig)
Diphenyläthylen	gelb	gelb
Anisylphenyläthylen	gelborange	orange
Dianisyläthylen	rotorange	rot
Dimethylaminodiphenyläthylen	gelb	gelb
Tetramethyldiaminodiphenyläthylen	gelb	orange
Fischer-Base	blaßgelb	blaßgelb

Daß trotz stärkerer Positivierung beim Dimethylaminodiphenyl- und Tetramethyldiaminodiphenyläthylen gegenüber den drei erstgenannten keine bathochrome Wirkung mehr auftritt, wird durch die Ammoniumsalzbildung an den Dimethylaminogruppen erklärt. Durch ionoid-nichtionoide Addition wird der Stickstoff koordinativ gesättigt und die positivierende und farbvertiefende Wirkung des Auxochroms gelöscht:



In stark saurer Lösung ist also das Tetramethyldiaminodiphenyläthylen in der Stärke der Positivierung dem Diphenyläthylen gleichzusetzen. Es zeigt die gleiche Halochromie. Daß das Carbeniumsalz der Fischer-Base trotz stärkster Positivierung kaum gefärbt ist,

stimmt mit der Beobachtung überein, daß Auxochrome, die direkt mit dem koordinativ ungesättigten Zentralatom verbunden sind, auf die Farbe keinen Einfluß ausüben.¹¹⁾

Diese kleine Reihe von Beobachtungen ließ erwarten, daß es möglich sein dürfte, mit Oleum unter geeigneten Bedingungen die in β -Stellung sulfonierten Äthylene zu fassen.


Wie bei keiner anderen Substitutionsreaktion sind bei der Sulfonierung Konzentration der angewandten Schwefelsäure, Mengenverhältnisse, Temperatur und Dauer des Erhitzens von Einfluß auf die Ausbeute der verschiedenen Substitutionsprodukte. Zahlreiche Reihenversuche ergaben, daß bei Anwendung eines ca. 12—15%igen Oleums im 10- bis 20fachen molaren Verhältnis zum Äthylen bei Anfangstemperaturen von ca. 50° mit nachträglichem Erhitzen auf 80—120° eine quantitative, harzfreie Umsetzung erzielt wird. Oleum eines geringeren SO₃-Gehaltes hatte bei den angegebenen Temperaturen nur unvollständige Umsetzung zur Folge. Temperaturen oberhalb 150° bewirkten aber schon merkbare Verkohlung. Diphenyl-, Anisylphenyl- und Dianisyläthylen zeigten sich bei Temperaturen bis 50° sogar gegen 60%iges Oleum durchaus beständig. Von der Verwendung eines derart hohen SO₃-Gehaltes wurde jedoch abgesehen, da hier die Gefahr des raschen Eintritts mehrerer Sulfogruppen vorlag. Zur Klärung des Mechanismus der Sulfonierung war es nötig, möglichst auch Monosulfosäuren zu fassen und die Reihenfolge des Eintritts mehrerer Sulfogruppen festzulegen.

Da außer beim Dimethylaminodiphenyl- und Tetramethyldiaminodiphenyläthylen die freien Sulfosäuren nicht kristallisierten, wurde versucht, durch Aussalzen mit NaCl, CH₃COONa, KCl oder NH₄Cl zu Na-, K-, oder Ammoniumsalzen zu gelangen. Aber auch diese Salze zeigten sich durchweg sehr hygroskopisch und für die Analyse unbrauchbar. Es wurde daher allgemein der übliche technische Weg der Isolierung der Ba-Sulfonate durch Neutralisation mit BaCO₃ und Absaugen in der Hitze vom BaSO₄ mit gutem Erfolg eingeschlagen.

Bei der Einwirkung von 10%igem Oleum auf Diphenyläthylen


11) R. Wizinger: Organische Farbstoffe, Bonn 1933.

wurden neben einem Sulfonierungsprodukt größere Mengen eines Dimerisationsproduktes erhalten, das M. Coenen¹²⁾ schon bei der Einwirkung von AlCl_3 auf Diphenyläthylen in CS_2 beobachtet hatte. Analog der bereits bekannten Dimerisation beim Isobutylen mit Schwefelsäure¹³⁾ kann auch hier folgender Reaktionsmechanismus angenommen werden:




Der Körper besitzt gute Kristallisationsfähigkeit. Er ist in Wasser und verdünnten Säuren unlöslich; mit konz. Schwefelsäure zeigt er gelbe Halochromie.

Steigerung des SO_3 -Gehaltes verhindert die Bildung des Dimerisationsproduktes zwar nicht völlig, jedoch gelingt eine weitgehende Zurückdrängung zugunsten einer Disulfosäure, deren Ba-Salz in guter Ausbeute erhalten wurde. Es besitzt die Zusammensetzung:



Das Salz ist mit dem von H. Limpricht und H. Schwannert¹⁴⁾ dargestellten analogen Ba-Salz einer Stilbendisulfosäure



isomer und ist ihm in vieler Hinsicht auffallend ähnlich. Beide Ba-Salze sind in Wasser leicht löslich und kristallisieren nur schwierig aus den hochkonzentrierten Lösungen. Die Alkalisalze sind stark


12) Diss. Bonn 1935, S. 74, daselbst Angabe weiteren Schrifttums.

13) A. Butlerow, A. 189, 44 (1877).

14) A. 145, 335 (1868).

hygroskopisch; die aus den Salzen beider Säuren mit Schwefelsäure abgeschiedenen freien Sulfosäuren kristallisieren nicht, sondern trocknen zu einem braunen Sirup ein; beide Ba-Salze geben mit Schwermetallsalzen keine Niederschläge. Das Ba-Salz der Stilbendisulfosäure war nach dem Fälln mit Alkohol gelb gefärbt und entfärbte sich beim Behandeln mit Tierkohle nicht. Das rohe, ebenfalls gelb gefärbte Salz des Diphenyläthylens konnte auch nicht mit gewöhnlicher Tierkohle, dagegen aber mit Carboraffin (I. G. Farbenindustrie) gefärbt werden.


Deuteten schon diese Analogien auf eine Kernsulfonierung hin, so konnte durch den oxydativen Abbau die Konstitution geklärt und damit bewiesen werden, daß eine Sulfonierung in der Seitenkette nicht stattgefunden hatte. Das Na-Salz entfärbt sodaalkalische KMnO_4 -Lösung rasch, ein Zeichen, daß die ungesättigte Seitenkette aboxydiert wird. Die Oxydationsflüssigkeit enthält jedoch keine SO_4 -Jonen, was der Fall sein müßte, wenn sich die Sulfogruppe in der Seitenkette befunden hätte. Der Eindampfrückstand liefert bei der Kalischmelze reine p-Oxybenzoesäure vom Spm. 213^0 ; er muß also Benzophenondisulfosäure enthalten haben:



Dieser Befund steht im Einklang mit der von W. Städel¹⁵⁾ durchgeführten Kalischmelze eines doppelt-sulfonierten Benzophenons.


Bei der Sulfonierung des Anisylphenyläthylens wurde die Bildung eines Dimerisationsproduktes nicht beobachtet. Unter den gleichen, schon beim Diphenyläthylen angewandten Versuchsbedingungen wurde das Ba-Salz einer Disulfosäure gefaßt, das sich in der

Konstitution von dem des Diphenyläthylens wesentlich unterscheidet:



Während die Stellung einer Sulfogruppe in der Seitenkette auf Grund des oxydativen Abbaus — nach der Oxydation mit KMnO_4 in sodaalkalischer Lösung konnte mit BaCl_2 im salzsauren Filtrat die einer Sulfogruppe äquivalente Menge BaSO_4 zur Wägung gebracht werden — als erwiesen gelten muß, sei die Stellung der zweiten Sulfogruppe unter Vorbehalt angegeben. Gewisse Anzeichen, wie die erschwerte Kernsulfonierung beim Dianisyläthylen deuten auf eine Substitution im freien Phenylrest, jedoch konnte in diesem Falle p-Oxybenzoesäure bei der Kalischmelze nicht isoliert werden. Das Ba-Salz der Disulfosäure kristallisiert mit zwei Mol Wasser; das Na-Salz erweist sich als sehr hygroskopisch; die freie Säure kristallisiert nicht und konnte nur in Form eines bräunlichen Sirups dargestellt werden. Die Verbindung zeigt mit konz. Schwefelsäure orangefarbene Halochromie.


Recht interessant verläuft die Sulfonierung des Dianisyläthylens. Unter gleichen Bedingungen wie beim Diphenyl- und Anisylphenyläthylen wurde ein gut kristallisierendes farbloses Ba-Salz einer Monosulfosäure isoliert:



Die Sulfonierung kann nur in der Seitenkette stattgefunden haben. Einerseits wurde durch Oxydation mit KMnO_4 in sodaalkalischer Lösung die Abspaltung der Sulfogruppe quantitativ festgestellt; andererseits ergab die Oxydation mit Chromsäure in Eisessig eine fast 100%ige Bildung des Dianisylketons (durch Mischschmelzpunkt identifiziert).


Die Mutterlauge des Ba-Sulfonates besteht wahrscheinlich —

die Analysendaten der zur Trockene eingedampften Lösung und ein in geringer Menge daraus mit Alkohol isoliertes Ba-Salz einer Disulfosäure deuten darauf hin — aus einem Gemisch von di- und trisubstituiertem Produkt. Um zu einem einheitlichen Körper zu kommen, wurde das Salzgemisch einer nochmaligen Sulfonierung mit 20%igem Oleum bei Temperaturen um 100° unterworfen. Es gelang auf diesem Wege, ein gelb gefärbtes Ba-Salz zu fassen, dessen Analysendaten auf drei Sulfogruppen stimmen:



Da es theoretisch nicht ausgeschlossen erschien, daß durch hochprozentiges Oleum wie durch Jodwasserstoffsäure das Äthylen enmethyliert worden wäre, wurde zur Kontrolle mit dem Salz eine Methoxylbestimmung nach A. Kirpel und T. B ü h n (vergl. S. 40) durchgeführt. Die Bestimmung zeigte jedoch, daß eine Entmethylierung nicht stattgefunden hatte.


Die Substitution in der Äthylengruppe ist experimentell bewiesen. Bei der Oxydation des Na-Salzes mit KMnO_4 wurde die Abtrennung einer Sulfogruppe quantitativ nachgewiesen (als BaSO_4). Ferner gelang die Isolierung des entsprechenden Ketons:



Die Stellung der beiden restlichen Sulfogruppen, wie sie in der Formel angegeben ist, wurde nicht bewiesen. Es ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß Sulfonierung in o-Stellung zur

Methoxygruppe in beiden Kernen stattgefunden hat. W. B. S h o b e r ¹⁶⁾ hat festgestellt, daß bei der Sulfonierung von Anisol mit Oleum von geringem SO₃-Gehalt unter 120° neben p- auch o-Produkt entsteht, während oberhalb 120° ausschließlich p-Anisolsulfosäure gebildet wird. Im vorliegenden Falle dirigieren jedoch die beiden funktionellen Gruppen, die Methoxy- wie auch die Sulfogruppe in der Seitenkette eindeutig in die 3-Stellung. Der Einfluß der Sulfogruppe ist allerdings gegenüber der Methoxygruppe durch die dazwischenliegende Vinylengruppe nur schwach.

Bei der Sulfonierung des Dimethylaminodiphenyläthylens mit ca. 12%igem Oleum und etwa zehnfach molarem Säureüberschuß konnte eine freie Sulfosäure erhalten werden. Die Säure kristallisiert nicht aus stark saurer Lösung, doch kann sie nach dem Abstumpfen der Schwefelsäure mit BaCO₃ in Form kleiner gelber Kriställchen vom Smp. 89—90° isoliert werden:




Die Bildung einer freien Säure im Gegensatz zum Diphenyl-, Anisylphenyl- und Dianisyläthylen überrascht hier nicht. Im Gegensatz zur Benzolsulfosäure ist auch die Sulfanilsäure leicht in kristallisierter Form zu erhalten, weil die Sulfogruppe mit der Aminogruppe ein inneres Salz von betainartigem Charakter bildet. Ganz analog ergibt auch hier die Sulfogruppe mit der Dimethylaminogruppe ein inneres Ammoniumsalz.


Eine Sulfonierung in der Seitenkette hat nicht stattgefunden. Nach vorsichtiger Oxydation in sodaalkalischer KMnO₄-Lösung können nämlich SO₄-Jonen nicht nachgewiesen werden. Mit einigem Vorbehalt wird deshalb dieser Sulfosäure die obige Konstitution zugeschrieben. Die o-Stellung der Sulfogruppe zur Äthylengruppe ist nicht erwiesen, jedoch ist wahrscheinlich durch die bekannte Ausschaltung des Auxochroms in stark schwefelsaurer Lösung der diri-

gierende Einfluß der Äthylengruppe hier ausschlaggebend. Auch die später beschriebene Sulfonbildung in dieser Körperklasse deutet auf die angenommene Konstitution hin.

Während die Bildung der Monosulfosäure nur in untergeordnetem Maße beobachtet werden konnte, war in guter Ausbeute ein Salzgemisch zweier Ba-Salze erhältlich, das sich nach zeitraubender Aufarbeitung (Näheres im experimentellen Teil) in ein Ba-Monosulfonat eines Sulfons:




und in ein Ba-Salz einer Disulfosäure zerlegen ließ:




Da durch Oxydation bei beiden Salzen keine SO_4 -Jonen gebildet wurden, ist erwiesen, daß in der Äthylengruppe eine Substitution nicht stattgefunden hat. Die in den Formeln angegebene Stellung der im Kern befindlichen Sulfogruppen sei jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt angegeben.

Aus dem Na-Monosulfonat könnte durch oxydativen Abbau nach Zusatz von BaCl_2 ein schwerlösliches gelbes Ba-Salz isoliert werden. Gemäß der Analyse liegt das entsprechende Keton des Sulfons vor:



Als letztes Sulfonierungsprodukt des Dimethylaminodiphenyl-äthylens konnte aus dem von der Neutralisation herrührenden BaSO_4 -Rückstand ein wasserunlösliches Sulfon in gut ausgebildeten grüngelben prismatischen Nadeln vom Smp. 178° isoliert werden:



Die Bildung von Sulfonen neben reinen Sulfonsäuren überrascht in dieser Körperklasse nicht. In der Reihe des Diphenylmethans ist die Sulfonbildung bei der Sulfonierung schon beobachtet worden. In einem Patent der Höchster Farbwerke ist das Sulfon des Tretamethyldiaminodiphenylmethans beschrieben¹⁷⁾. Es entsteht mit 20%igem Oleum bei 150° . Über dieses Sulfon gelang F. Sachs¹⁸⁾ durch Kondensation mit Nitrosodimethylanilin die Darstellung des Sulfons des Michler'schen Ketons. Die hier beschriebenen Verbindungen besitzen mit den von uns dargestellten Sulfonierungsprodukten des Dimethylaminodiphenyläthylens in Farbe, Kristallisation und Löslichkeitsverhältnissen weitgehend analoge Eigenschaften.


Die weitere Untersuchung dieser sehr interessanten Körperklasse soll jedoch einer späteren Zeit vorbehalten bleiben.

Tretamethyldiaminodiphenyläthylen ist bereits so stark posi-


17) Erdl. II, 59. DRP 54621.

18) B. 33,965 (1900).

viert, daß schon eine bemerkenswerte Beständigkeit des salzartigen ionoiden Zwischenproduktes eintritt. Beim Eingießen der klaren Sulfonierungsmischung, — durch die erwähnte Auslöschung der Dimethylamino-Auxochrome nur gelb gefärbt — in Eiswasser tritt intensive Grünfärbung ein:




Die Färbung ist in schwach saurer Lösung haltbar. Das Farbsalz kristallisiert nicht daraus. Erst auf Zusatz von BaCO_3 geht die Farbe kurz vor Erreichung des Neutralpunktes über blau nach farblos zurück. Das nach dem Abscheiden des gebildeten BaSO_4 aus dem Filtrat kristallisierende farblose Salz färbt sich schon nach kurzem Liegen an der Luft durch geringe Säurespuren wieder blaugrün an. In Eisessig löst sich das Salz mit intensiv grünstichig blauer Farbe, die sich von der rotstichig blauen Halochromieerscheinung des freien Äthylens mit Eisessig deutlich unterscheidet:



Die Konstitution des Ba-Monosulfonates des Tretamethyldiaminodiphenyläthylens gilt durch den oxydativen Abbau als geklärt. Durch Oxydation in sodaalkalischer Lösung mit KMnO_4 konnte sowohl die Sulfogruppe quantitativ abgespalten und als BaSO_4 zur Wägung gebracht werden, als auch Michler'sches Keton durch Schmelzpunkt


und Mischschmelzpunkt einwandfrei nachgewiesen werden. Die Substitution am β -C-Atom ist damit als erwiesen anzusehen.

Bei dem Versuch, höher sulfonierte Produkte dieses Äthylens zu fassen, zeigte sich, daß eine längere Einwirkungszeit des 15%igen Oleums besser zum Ziele führte als eine Steigerung des SO_3 -Gehaltes der Schwefelsäure. Nach etwa achttägigem Stehen der Lösung wurde auf Eis gegossen. Nach wochenlangem Stehen schieden sich dann aus dieser verdünnten Schwefelsäure gut ausgebildete orangefarbene Kristalle ab:




Während die Substitution in der Seitenkette durch den oxydativen Abbau als gesichert gilt, sei die Stellung der zweiten Sulfogruppe im Kern unter Vorbehalt angegeben.

In der Fischer-Base ist die Positivierung so stark, daß das Zwischenprodukt, das Sulfosäuremethylen-carbeniumbisulfat:



an sich beständig sein dürfte. Das Äthylen löst sich, wie bereits erwähnt, in Schwefelsäure und auch in Oleum mit schwachgelber Farbe. Bei der Neutralisation des Sulfonierungsgemisches mit BaCO_3 findet quantitative Rückbildung der Base statt. Die Schwefelsäure gibt also lediglich das Methylcarbeniumbisulfat:




Dieses ist, zumal bei Gegenwart überschüssiger Säure durchaus beständig, so daß kein freies Äthylen mehr vorhanden ist, an welches sich $\text{HO}_3\text{S-OSO}_3\text{H}$ in der besprochenen Weise anlagern können.

Zusammenfassend kann gesagt werden: bei der Sulfonierung der Äthylene mit Oleum fand außer beim Diphenyl-, dem Dimethylaminodiphenyläthylen und der Fischer-Base eine Substitution in der Seitenkette statt.

Die Beobachtungen an der Fischer-Base zeigen deutlich, daß die Methylcarbeniumsalzbildung den Substitutionsvorgang erschwert. Es liegt daher die Vermutung nahe, daß auch bei den anderen Äthylenen die Sulfonierung leichter gelingen dürfte unter Bedingungen, bei denen eine Methylcarbeniumsalzbildung ausgeschlossen ist. Insbesondere wäre bei Auffindung solcher Bedingungen Aussicht vorhanden, auch beim Diphenyläthylen und bei der Fischer-Base die Sulfonierung am β -C-Atom durchführen zu können. Die Bromierung des Diphenyläthylens gelingt bekanntlich sehr glatt.

Die gesuchten Bedingungen wären erfüllt, wenn es gelänge, ein Sulfonierungsmittel zu finden, mit dem in neutraler oder alkalischer Lösung gearbeitet werden könnte. Hierzu erschien das Additionsprodukt von SO_3 an Pyridin, die sogenannte N-Pyridinsulfosäure geeignet.


Es ist das Verdienst P. Baumgartens¹⁹⁾, den Vorgang der Sulfonierung mit Chlorsulfonsäure bei Gegenwart von Pyridin, der bei der technischen Darstellung der Indigosole zu ungeahnter Bedeutung gelangt ist, weitgehend aufgeklärt zu haben. Als das die Reaktion vermittelnde Produkt erkannte er die N-Pyridinsulfosäure. Diese entsteht unmittelbar aus Pyridin und SO_3 , oder bequemer aus Pyridin und Chlorsulfonsäure:



19) B. 59,1166 und 1976 (1926). — B. 64,1502 (1931).

Chlorsulfonsäure bei Gegenwart von Pyridin hat bereits früher²⁰⁾ zur Anlagerung von SO_3 gedient, ohne daß die intermediäre Bildung und die besonderen Vorzüge der N-Pyridinsulfosäure erkannt worden wäre. Es wurden vor uns vor allem aus Phenolen und Aminen saure Schwefelsäurephenylester und N-Sulfosäuren dargestellt. Das Pyridin erfüllt hier die doppelte Aufgabe der Bindung der entstehenden Salzsäure und der Übertragung des SO_3 auf die betreffende Substanz. P. Baumgarten berichtet, daß sich die N-Pyridinsulfosäure als nie versagendes Sulfonierungsmittel erwiesen habe und mit ihr theoretisch sämtliche organischen Verbindungen zu sulfonieren wären, die auch auf anderem Wege sulfonierte Produkte ergäben. Es wurde deshalb nun versucht, auch unsere Äthylene in der Seitenkette mit der N-Pyridinsulfosäure zu sulfonieren.


Unter Feuchtigkeitsabschluß und damit unter Vermeidung der Carbeniumsalzbildung wurde Diphenyläthylene und N-Pyridinsulfosäure in molarem Verhältnis bei 120° solange zusammengeschmolzen bis das Pyridin abdestilliert und durch den Geruch nicht mehr wahrnehmbar war. Die erhaltene Säure wurde mit BaCO_3 neutralisiert und das Ba-Sulfonat des Diphenyläthylens isoliert. Der oxydative Abbau beweist eindeutig, daß Substitution bzw. SO_3 -Addition in der Seitenkette stattgefunden hat:




Gleichzeitig kann damit als erwiesen angesehen werden, daß bei Ausschaltung der Möglichkeit der Carbeniumsalzbildung das β -C-Atom reaktionsfähiger ist als die C-Atome der Benzolringe, so daß hier Addition von SO_3 am β -C-Atom unter Bildung einer Äthylensulfosäure erfolgt.

Unter den gleichen Bedingungen konnte das Ba-Salz des in der Seitenkette sulfonierten Anisylphenyläthylens dargestellt werden:

20) J. Wagner, B. 19, 1157 (1886).




Ebenfalls gelang es auf demselben Wege, Dianisyläthylen zu sulfonieren und damit das gleiche Ba-Monosulfonat zu fassen, das schon mit Oleum erhalten worden war. Die Identität beider Verbindungen war durch den oxydativen Abbau klar zu erkennen:



Beim Dimethylaminodiphenyl- und Tetramethyldiaminodiphenyläthylen, die beim Zusammenschmelzen mit N-Pyridinsulfosäure um 120° teilweise Verharzung und Verkohlung zeigten, wurden durch Erhitzen in nitrobenzolischer Lösung geringe Mengen farbloser Kristalle bzw. beim Tetramethyldiaminodiphenyläthylen außerdem ein intensiv grünes Produkt beobachtet. Eine genaue Charakterisierung gelang wegen Substanzmangels bisher nicht. P. Baumgarten hat gezeigt, daß auch Dimethylanilin am Stickstoff SO_3 zu addieren vermag, und es ist sehr gut möglich, daß bei diesen beiden Äthylenen die Anlagerung von SO_3 an die Dimethylaminogruppe störend gewirkt hat.


Aus Fischer-Base und N-Pyridinsulfosäure in nitrobenzolischer Lösung wurde eine Sulfosäure erhalten, die nach dem Umkristallisieren aus verdünntem Alkohol unter Aufnahme eines Mols Wasser farblose Nadelchen vom Smp. 206° bildet. Es darf ihr wohl die Konstitution eines inneren Carbeniumsulfonats zugeschrieben werden:



Die Säure bildet mit BaCl_2 einen schwer löslichen Niederschlag. Die


freie Säure hält sich an der Luft mehrere Tage, zerfällt aber beim Kochen mit Sodalösung schnell. Es tritt der typische Geruch nach der freien Base ein. Nach dem Ansäuern mit Salzsäure sind SO_4 -Ionen nachzuweisen. —

Zum Schluß wurden die Äthylene mit Toluolsulfochlorid umgesetzt. Die Komponenten wurden in benzolischer Lösung zusammengebracht und längere Zeit zum Sieden erhitzt. Eine Umsetzung konnte nur beim Tetramethyldiaminodiphenyläthylen und bei der Fischer-Base beobachtet werden. Es erwies sich bald, daß der Mechanismus der Reaktionen analog dem von M. C o e n e n ²¹⁾ am Pikrylchlorid und Dinitrochlorbenzol beobachteten verlief. Beim Abkühlen der benzolischen Lösungen fielen die Chlorhydrate aus:



Das doppelte Chlorhydrat des Tetramethyldiaminodiphenyläthylens erwies sich als identisch mit dem von H. D e b r ü s ²²⁾ erhaltenen Produkt. Es ist ein farbloses Salz vom Smp. 207—208°.

Das Chlorid der Fischer-Base




wurde durch langwierige Reinigung mit Äther und Aceton als farbloses Salz vom Smp. 223° isoliert. Es ist identisch mit dem aus Fischer-Base und Salzsäure dargestellten Präparat.

Neben der Abscheidung dieser farblosen Chlorhydrate wurden beim Tetramethyldiaminodiphenyläthylen eine intensiv grüne, bei der Fischer-Base eine intensiv violettrote benzolische Lösung erhal-

21) Diss. Bonn 1935.

22) Privatmitteilung.

ten. Es gelang bisher nicht, die farbigen Verbindungen in kristalliner Form zu fassen. Nach dem Mechanismus:



liegen hier vermutlich Sulfone vor. Die Bearbeitung der Vorversuche über diese Äthylensulfone bleibt mit den bereits auf S. 19—20 beschriebenen ringgeschlossenen Sulfonen einer späteren Untersuchung vorbehalten.

Experimenteller Teil

A. Ausgangsmaterialien.

1. Diphenyläthylen.

Das Äthylen wurde nach einer kombinierten Methode von A. Klages (B. 35, 2646 [1902]) und A. Kaufmann (Ph. Ch. 55, 556 [1906]) dargestellt. (Vergl. Diss. Coenen, Bonn.) Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Vorschriften in der Literatur bietet diese Methode den Vorzug, das Äthylen bequem in größeren Mengen mit gleichbleibenden Ausbeuten (ca. 80% d. Th.) darzustellen.

Zu einer Grignardlösung aus 157 g Brombenzol und 25 g Magnesiumspänen in 400 ccm Äther läßt man eine Mischung von 120 g Acetophenon und 100 ccm Äther zufließen. Nach beendeter Reaktion wird noch zwei Stunden am Rückflußkühler auf dem Wasserbad erhitzt. Man läßt über Nacht stehen und zersetzt das Reaktionsgemisch mit Eis. Die ätherische Schicht wird nach dem Absitzen im Scheidetrichter abgeschieden, über CaCl_2 getrocknet und während einer Stunde HCl -Gas eingeleitet. Dabei scheidet sich am Boden des Gefäßes eine hochprozentige wässrige Salzsäure ab. Man gibt Wasser hinzu, trennt die ätherische Schicht ab und wäscht sie mit Sodalösung neutral. Nach dem Trocknen des Äthers über CaCl_2 dampft man ab und unterwirft den Rückstand der Vakuumdestillation. Bei 162°/15 mm geht farbloses reines Diphenyläthylen über, das, luftdicht verschlossen und im Dunkeln aufbewahrt, sich monatelang ohne Zersetzung hält. Dem direkten Licht ausgesetzt, nimmt das Äthylen schon bald eine schwach gelbe Farbe an.

Ausbeute: 140 g = 78% d. Th.

2. Anisylphenyläthylen.

Anisylphenyläthylen wurde nach einer abgeänderten Methode von S. Skraup und L. Freundlich (A. 431, 255 [1923]) aus p-Methoxyacetophenon und Phenylmagnesiumbromid dargestellt. Das Acetylanisol wurde nach einer Vorschrift von F. Straus (A. 347, 139 Anm. [1910]) erhalten.

p-Methoxyacetophenon: 100 g Aluminiumchlorid werden in einem mit Rückflußkühler und Tropftrichter versehenen Kolben mit 125 g Schwefelkohlenstoff überschichtet und unter Eiskühlung mit 59 g Acetylchlorid versetzt. Ist die sofort einsetzende Reaktion zu Ende, läßt man 43 g Anisol so zutropfen, daß die Flüssigkeit in gelindem Sieden bleibt. Man läßt unter öfterem Schütteln eine Stunde stehen, erwärmt noch 10 Min. auf 40° und gießt die obere Schicht ab. Die tiefviolette untere Schicht wird mit Eis zersetzt und das entstehende Öl sofort mit Äther aufgenommen. Zur Entfernung phenolartiger Nebenprodukte wird die Ätherlösung mit Natronlauge gewaschen, über CaCl_2 getrocknet, der Äther abdestilliert und der Rückstand im Schwertkolben der Vakuumdestillation unterworfen. Der bei $165\text{—}170^{\circ}/25\text{ mm}$ übergehende Anteil ist fast reines Keton und erstarrt beim Erkalten. Aus Methanol umkristallisiert: Smp. 36° . Von der Reinheit dieses Acethylanisols hängt weitgehend die Ausbeute des Äthylens ab.

Anisylphenyläthylen: Man löst das erhaltene Acethylanisol (37 g = 63% d. Th. bez. auf Anisol) in 50 ccm Benzol und läßt es zu einer Grignardlösung von 39 g Brombenzol und 7 g Magnesiumspänen in 100 ccm Äther zutropfen. Nach beendeter Reaktion erhitzt man noch eine Stunde auf dem Wasserbad und läßt über Nacht stehen. Es wird mit Eis zersetzt, die abgeschiedene Äther-Benzolschicht über CaCl_2 getrocknet und eine Stunde lang ein trockener HCl-Strom durchgeleitet. Man unterschichtet mit Wasser, trennt die Ätherbenzolschicht ab und wäscht sie mit Sodalösung neutral. Nach dem Trocknen über CaCl_2 wird eingedampft, der Rückstand mit Essigsäureanhydrid erwärmt und mit Wasser verdünnt. Das sich abscheidende Äthylen wird aus abs. Alkohol umkristallisiert: farblose glänzende Blättchen vom Smp. 75° .

Ausbeute: 30 g = 60% d. Th.

3. Dianisyläthylen.

Das Äthylen wurde nach einer Methode von R. W i z i n g e r und C o r r (Diss. Bonn 1932) gewonnen.

Zu einer Lösung von 108 g Anisol und 76 g Chloracetal läßt man bei Temperaturen von -5° bis $+2^{\circ}$ die Mischung von 400 g

conc. Schwefelsäure in 400 g Eisessig unter mechanischem Rühren langsam zutropfen. Nach beendeter Zugabe wird noch drei Stunden turbiniert. Über Nacht entmischt sich die rosa gefärbte Emulsion im Scheidetrichter. Die obere Schicht wird abgetrennt, in Methanol gelöst und mit der Lösung von 120 g Ätzkali in 750 ccm Methanol 4 Stunden unter Rückfluß gekocht. Das sich abscheidende Äthylen wird nach dem Erkalten filtriert und aus Eisessig — farblos glänzende Blättchen — oder aus Tetrachlorkohlenstoff — gut ausgebildete Nadelchen — umkristallisiert. Smp. 143°.

Ausbeute: 84 g = 70% d. Th.

4. Dimethylaminodiphenyläthylen.

Dimethylaminobenzophenon wurde nach Friedländer I 45, DRP 41751 gewonnen, daraus durch Grignardierung das Äthylen nach einer abgeänderten Methode von H. Fecht (B. 40,3902 [1907]).

Dimethylaminobenzophenon: 100 g Anilin werden in 300 ccm Benzol mit 140 g Benzoylchlorid unter guter Außenkühlung tropfenweise versetzt. Das Reaktionsgemisch wird mit Sodalösung neutralisiert und mit Wasser gewaschen. 146 g (= 74% d. Th.) des erhaltenen, pulvertrockenen Benzanilids (Smp. 155°) werden in einem Kolben ohne Kühler mit 292 g Dimethylanilin und 146 g Phosphoroxychlorid unter stetem Rühren auf Wasserbadtemperatur erwärmt. Sobald die Temperatur durch Selbsterwärmung steigt, wird unterbrochen. Das Reaktionsgemisch soll 120° nicht übersteigen, muß aber diese Temperatur erreichen. Nach dem Abkühlen wird in 700 ccm 5%iger Salzsäure bei 50° gelöst und mit 5%iger Natronlauge bis zum auftretenden Geruch nach Dimethylanilin unter dauerndem Rühren versetzt. Dimethylaminobenzophenon scheidet sich in grünen Flocken ab. Es wird durch Umfällen aus verdünnter Salzsäure und Natronlauge gereinigt: Smp. 84°.

Dimethylaminodiphenyläthylen: Das erhaltene Keton (58 g = 35% d. Th.) läßt man in benzolischer Lösung zu einer Grignardlösung aus 100 g Methylbromid und 25 g Magnesiumspänen in 500 ccm Äther fließen. Nach einstündigem Erhitzen läßt man über Nacht stehen. Man zersetzt mit verdünnter Salzsäure. Zwischen

Benzol- und Wasserschicht scheidet sich nach einiger Zeit das Chlorhydrat des Äthylens kristallin ab. Man trennt die Kristallschicht nach 24 Std. ab und erhitzt sie eine Stunde mit alkoholischem Kali unter Rückfluß. Beim Eingießen in Wasser scheidet sich das Äthylen in gelben Flocken ab. Nach dem Umkristallisieren aus Alkohol und schließlich aus Aceton erhält man blaßgelbe Nadelchen vom Smp. 57° .

Ausbeute: 42 g = 73% d. Th. — Das Äthylen ist lichtempfindlich und nimmt an der Luft eine bräunlichrote Färbung an. Im Dunkeln luftdicht aufbewahrt hält es sich beliebig lange.

5. Tetramethyldiaminodiphenyläthylen.

Das Äthylen wurde nach einer Methode von M. Freund und F. Meyer (B. 39, 1118 [1906]) dargestellt, die Methode aber insofern abgeändert, als zur Erzielung besserer Ausbeuten (ca. 80% d. Th.) in bezug auf das angewandte Keton der vierfache Überschuß an Grignardreagenz angewendet wurde. Außerdem wurde vom Grignardreagenz der Äther abgedampft und in benzolischer Lösung weitergearbeitet.

Von einer Grignardlösung aus 200 g Methylbromid und 50 g Magnesiumspänen in 600 ccm Äther wird der Äther vorsichtig abgedampft und der Rückstand in Benzol aufgenommen. Hierzu wird eine Suspension von 140 g Michler'schem Keton in 600 ccm Benzol zugegeben. Man erhitzt zwei Stunden unter Rückfluß und läßt über Nacht stehen. Unter Kühlung wird mit verdünnter Salzsäure zersetzt, die klare wässrige Schicht vom Benzol getrennt und mit verdünntem Ammoniak das Äthylen als grüne flockige Masse ausgefällt. Nach nochmaligem Umfällen aus Salzsäure-Ammoniak wird heiß in möglichst wenig Benzol gelöst und die gleiche Menge Methanol zugesetzt. Beim Abkühlen erstarrt die Lösung zu feinen blaßgrünen verfilzten Nadelchen. Nach dem Umkristallisieren aus heißem Methanol unter Zusatz eines Tropfens Ammoniak ist die Substanz farblos. Smp. 127° . Das Äthylen wird in dunkler Flasche luftdicht aufbewahrt.

Ausbeute: 111 g = 80% d. Th.

6. Fischer-Base (Trimethylmethylen-dihydro-indol).

Das Äthylen wurde uns in liebenswürdiger Weise von Herrn Direktor Dr. Wahl, I. G. Leverkusen, zur Verfügung gestellt.

7. p-Toluolsulfochlorid.

Das technische, aus der Saccharin-Fabrikation abfallende, unangenehm stechend riechende Produkt ist stark mit Toluolsulfosäure und o-Toluolsulfochlorid verunreinigt. Zur Reinigung wird es zunächst auf Ton abgepreßt und so die Hauptmenge des öligen o-Toluolsulfochlorids entfernt. Durch mehrmaliges Lösen, Filtrieren und Umkristallisieren abwechselnd aus Benzol und Äther erhält man gut ausgebildete, farb- und geruchlose rhombische Tafeln vom Smp. 69°. Aus den technischen Produkten werden bisweilen nicht mehr als 20% erhalten.

8. N-Pyridinsulfosäure.


N-Pyridinsulfosäure wurde nach einer von P. Baumgarten (B. 59, 1166 [1926]) angegebenen Methode dargestellt.

158 g (2 Mol) frisch destilliertes Pyridin werden in ca. 100 ccm Tetrachlorkohlenstoff gelöst. Unter Abschluß von Feuchtigkeit läßt man 116 g (1 Mol) Chlorsulfonsäure zutropfen. Um einen milden Ablauf der Reaktion zu gewährleisten, ist gute Kühlung durch ein Eis-Kochsalzgemisch unter Vermeidung höherer Temperaturen als +7° sowie innige Durchmischung der reagierenden Bestandteile erforderlich. Das sofort entstehende weiße kristalline Produkt wird durch Absaugen auf der Nutsche vom CCl₄ befreit, sorgfältig mit Eiswasser ausgewaschen und zur Entfernung des in äquivalenter Menge gebildeten Pyridinchlorhydrates mehrere Male dekantiert. Das so gewonnene Endprodukt läßt sich nicht umkristallisieren. Es wird im Exsiccator über Phosphorpentoxyd völlig getrocknet. An der Luft zersetzt sich die Substanz und zerfließt schnell.

B. Umsetzungen von einseitig positivierten Äthylenen mit Oleum

9. Diphenyläthylen und Oleum.


a) Dimerisationsprodukt:



3,6 g (1/50 Mol) Diphenyläthylen werden bei Zimmertemperatur tropfenweise unter dauerndem Turbinieren zu ca. 10 g 10%igem Oleum (ca. 1/10 Mol) gegeben. Mit dem Zusatz einer neuen Menge wird immer so lange gewartet, bis der letzte Anteil, der zunächst als Öl mit dunkelgrüner Oberflächenfarbe auf der Schwefelsäure schwimmt, sich gelöst hat. Zur Vermeidung von Ausscheidungen harziger Bestandteile wird die Äthylenzugabe in der Weise geregelt, daß die Temperatur 50° nicht übersteigt. Nach beendeter Zugabe setzt man das Turbinieren noch 15 Min. fort und läßt die klare, gelb gefärbte Lösung 5 Tage in der Kälte stehen. Nach dieser Zeit hat sich auf der Schwefelsäure eine schwach grüngelb gefärbte Kristallmasse abgeschieden, die, vorsichtig von der Säure abgehoben, mit heißem Wasser bis zur Farblosigkeit behandelt wird. Nach dem Trocknen auf Ton wird abwechselnd aus siedendem abs. Alkohol und Tetrachlorkohlenstoff umkristallisiert. Man erhält gut ausgebildete, farblose Kristalle vom Smp. 143°. Ein Mischschmelzpunkt mit dem von Coenen (Diss. Bonn 1936) beschriebenen Produkt, dargestellt aus Diphenyläthylen und AlCl_3 , zeigt keine Erniedrigung. Die Substanz ist unlöslich in Wasser und Eisessig, löslich in Alkohol, Äther und Benzol. Mit konz. Schwefelsäure zeigt sie gelbe Halochromie.

Analyse: 28,26 mg Subst. 96,62 mg CO_2 17,20 mg H_2O .
 $(\text{C}_{14}\text{H}_{12})_2$: Ber. 93,28% C 6,72% H
 Gef. 93,25% C 6,81% H

b) Ba-Salz der Disulfosäure:



Man läßt 3,6 g (1/50 Mol) Diphenyläthylen unter ständigem Turbinieren in ca. 20 g 12%iges Oleum (ca. 1/5 Mol) unter Eiskühlung eintropfen, so, daß die Bildung harziger Produkte vermieden wird. Nach erfolgter Zugabe wird noch 30 Min. unter Temperaturerhöhung auf 80° turbiniert. Nach dreitägigem Stehen im Trockenschrank bei 60—70° wird von geringen Mengen des unter a) be-

schriebenen Dimerisationsproduktes abfiltriert und in ca. 500 ccm Eiswasser gegeben. Die klare Lösung wird in der Siedehitze mit einer Aufschlämmung von BaCO_3 in Wasser bis zur Neutralisation versetzt, kurz aufgekocht und heiß vom gebildeten BaSO_4 abgesaugt. Das gelb gefärbte Filtrat wird auf offener Flamme auf ca. 20 ccm eingengt. Man läßt erkalten und filtriert von einem geringen farblosen Niederschlag ab. (Scharf getrocknet, deutet die Ba-Bestimmung auf das Ba-Salz einer Monosulfosäure hin). Das Filtrat wird zur Trockene eingedampft und die erhaltene schwach gelbe Kristallmasse in fein gepulverter Form mehrere Stunden unter Rückfluß mit abs. Alkohol gekocht. Neben der gelben alkoholischen Lösung erhält man ein farbloses Kristallpulver, das, mit heißem Methylalkohol gewaschen, in wenig Wasser gelöst und im Vakuumexsiccator zur Kristallisation gebracht wird. Das Salz ist in Wasser leicht löslich; bei sehr hoher Temperatur verkohlt es ohne zu schmelzen; mit konz. Schwefelsäure gibt es gelbe Halochromie.

Analyse: 156,30 mg Subst.	11,00 mg Trockenverlust	
39,24 mg Subst.	47,01 mg CO_2	10,05 mg H_2O
	17,74 mg Rückstand (BaSO_4)	
$\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_6\text{S}_2\text{Ba} + 2\text{H}_2\text{O}$:	Ber. 32,76% C	Gef. 32,67%
	2,76% H	2,87%
	26,85% Ba	26,60%
	7,11% H_2O	7,04%

Die freie Sulfosäure kristallisiert nicht. Das Ba-Salz wurde mit der äquivalenten Menge H_2SO_4 versetzt und vom gebildeten BaCO_3 filtriert. Beim Eindampfen der wässrigen Lösung im Vakuum erhält man ein schwach gelb gefärbtes Öl, das sehr leicht wasserlöslich und sehr hygroskopisch ist.


Die Isolierung des Na-Salzes durch Aussalzen aus der schwefelsauren Lösung gelang nach keiner der üblichen Methoden. Das über das Ba-Salz mit Soda isolierte Na-Sulfonat ist gut wasserlöslich und hygroskopisch.

Versuche, aus dem Ba-Salz gut kristallisierende Schwermetallsalze mit PbCl_2 , CuCl_2 , FeSO_4 u. a. zu erhalten, hatten keinen Erfolg.

Die wässrigen Lösungen sowohl der freien Sulfosäure wie ihrer Salze besitzen Schaumwirkung.

Oxydativer Abbau: Die heiße wässrige Lösung einer Probe des Ba-Salzes wurde mit K_2CO_3 -Lösung in geringem Überschuß versetzt und vom ausfallenden $BaCO_3$ klar filtriert. Zum Filtrat ließ man bei Wasserbadtemperatur unter stetem Rühren bis zur eben bleibenden Violettfärbung einen $\frac{1}{2}$ $KMnO_4$ -Lösung zutropfen. Danach wurde vom gebildeten MnO_2 abfiltriert, mit Salzsäure angesäuert, mit Pottasche neutralisiert und auf dem Wasserbad bis zur sirupartigen Konsistenz eingedampft. Mit einem großen Überschuß an Ätzkali wurde im Nickeltigel verschmolzen. Die Temperatur wurde allmählich gesteigert, bis eine entnommene Probe mit $BaCl_2$ die Bildung von SO_4 -Jonen anzeigte. Die Schmelze wurde noch etwa 2 Std. auf dieser Temperatur gehalten. Nach dem Abkühlen wurde in Wasser gelöst, angesäuert und wiederholt mit Äther extrahiert. Beim Abdampfen des Äthers erhielt man einen kristallinen Rückstand, der sich nach dem Umkristallisieren aus Wasser in büschelförmigen Nadelchen abschied. Smp. $212-213^\circ$. Ein Mischschmelzpunkt mit reiner p-Oxybenzoesäure zeigte keine Erniedrigung.

10. Sulfonierung des Anisylphenyläthylens.
Ba-Salz einer Disulfosäure:



4,6 g ($\frac{1}{50}$ Mol) Anisylphenyläthylen werden in feingepulverter Form in kleinen Portionen unter Turbinieren zu ca 10 g 12%igem Oleum (ca. $\frac{1}{10}$ Mol) zugesetzt. Während der Zugabe soll zur Vermeidung harziger Produkte die Temperatur 50° nicht übersteigen. Zum Schluß erhitzt man die klare, wenig intensiv orange gefärbte Lösung eine Stunde auf 80° . Nach achttägigem Stehen hat sich auf der Oberfläche eine schwach gelb gefärbte, weiche wachsähnliche Masse abgeschieden. Da sie auf Ton über P_2O_5 im Exsiccator nicht getrocknet werden kann und die Lösungsverhältnisse und Reaktionen auf die noch mit geringen Mengen H_2SO_4 durchsetzte freie Sulfo-

säure schließen lassen, wird die Masse mit der Lösung zusammen in Eiswasser klar gelöst, mit BaCO_3 in der Siedehitze bis zur Neutralisation versetzt, kurz mit Carboraffin (I. G. Farbenindustrie) aufgekocht und das klare farblose Filtrat zunächst auf dem Wasserbad auf 5 ccm eingengt. Man versetzt mit 50 ccm abs. Methanol und filtriert nach mehreren Stunden von dem zuerst flockigen, später fein kristallinen Niederschlag ab. Nach dem Waschen mit heißem Methanol wird das Salz, das sich aus organischen Lösungsmitteln nicht umkristallisieren läßt, in wenig Wasser gelöst und im Vakuum-exsiccator der Kristallisation überlassen. Das Ba-Sulfonat erstarrt zu einer harten Kristallmasse, die nach mehrtägigem Stehen im Exsiccator einen konstanten Kristallwasser-Gehalt aufweist. Das Salz verkohlt oberhalb 300° . Mit konz. Schwefelsäure gibt es rotorangefarbene Halochromie. — Die Kristallwasserbestimmung wurde in der Trockenpistole über Xylol ausgeführt.

Analyse: 121,10 mg Subst. 8,00 mg Trockenverlust

34,41 mg Subst. 41,88 mg CO_2 9,74 mg H_2O

168,50 mg Subst. 71,91 mg BaSO_4

$\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}_7\text{S}_2\text{Ba} + 2 \text{H}_2\text{O}$: Ber.	33,24% C	Gef.	33,24%
	2,97% H		3,17%
	25,36% Ba		25,11%
	6,65% H_2O		6,61%


Oxydativer Abbau: 208,8 mg des Ba-Salzes wurden mit Soda-lösung in geringem Überschuß quantitativ in das Na-Salz übergeführt. Nach Abfiltrieren vom ausgeschiedenen BaCO_3 wurde tropfenweise bis zur bleibenden Violettfärbung mit KMnO_4 -Lösung versetzt. Nach einer Stunde wurde vom MnO_2 filtriert und das Filtrat mit Salzsäure stark angesäuert. Zu der farblosen klaren Lösung gab man in der Hitze eine wässrige Lösung von 0,2g BaCl_2 . Man kochte auf und ließ den gebildeten Niederschlag absitzen. Nach mehrfachem Dekantieren mit heißer verdünnter Salzsäure gab man durch ein gehärtetes Filter und wusch gut mit siedendem Wasser aus. Das veraschte und geglühte rein weiße BaSO_4 wurde zur Wägung gebracht. Die Analyse zeigte eindeutig, daß von zwei vorhandenen HO_3S -Gruppen eine durch Aufspaltung und Oxydation der Äthylen-Doppelbindung als Sulfat isoliert wurde.

Analyse: 208,8 mg Subst. 44,35 mg BaSO₄

Ber. für 1 Sulfogruppe: 12,68% Ba Gef. 12,50%

II. Sulfonierung des Dianisyläthylens.

a) Ba-Salz der Monosulfosäure:



In 20 g 15%iges Oleum (ca. 1/5 Mol) gibt man fein gepulvertes Dianisyläthylen. Man arbeitet mit mechanischem Rührwerk und setzt das Äthylen in kleinen Portionen so lange zu, bis die Schwefelsäure kein freies SO₃ mehr entwickelt. Auf diese Weise werden ca. 5 g (ca. 1/50 Mol) so eingetragen, daß mit einer neuen Portion immer so lange gewartet wird, bis die vorhergehende mit kirschroter Farbe klar gelöst ist. Unter Temperaturerhöhung auf 80° wird das Turbinieren nach beendeter Zugabe noch eine Stunde fortgesetzt. Man läßt 24 Std. bei 50–60° stehen. Danach wird die intensiv rote Lösung in Wasser gegossen. Dabei findet ein Farberückgang nach wenig intensiv tee Braun statt. Sodann wird in der Siedehitze mit BaCO₃ bis zur Neutralisation versetzt. Es wird siedend heiß vom BaSO₄ abgesaugt und gut mit kochendem Wasser gewaschen. Das klare Filtrat scheidet nach dem Einengen auf ca. 50 ccm in der Kälte eine farblose Kristallmasse in feinen Büscheln ab. Nach dem Umkristallisieren aus Wasser erhält man glänzende Kristallflitter. Beim Erhitzen auf sehr hohe Temperatur verkohlt und verbrennt das Salz ohne vorher zu schmelzen. Es ist wenig löslich in kaltem, schwer löslich in heißem Wasser.

Analyse: 223,6 mg Subst. 19,00 mg Trockenverlust

28,54 mg Subst. 47,53 mg CO₂ 11,08 mg H₂O

7,81 mg BaSO₄

C₃₂H₃₀O₁₀S₂Ba + 4 H₂O: Ber. 45,30% C Gef. 45,42%

4,52% H 4,34%

16,20% Ba 16,11%

8,50% H₂O 8,50%


Oxydativer Abbau: Eine Probe des Ba-Salzes wurde mit der berechneten Menge Soda in das Na-Salz übergeführt. Es wurde vom ausgeschiedenen BaCO_3 abfiltriert und die Lösung zur Trockene verdampft. Das hygroskopische Salz wurde mit der gleichen Menge Chromsäure in Eisessig solange unter Rückfluß erhitzt, bis die Lösung die reine Chromsalzfarbe angenommen hatte. Nach dem Erkalten wurde in 500 ccm Wasser gegeben und vom in fast quantitativer Ausbeute ausfallenden Dianisylketon abfiltriert. Das aus CCl_4 einmal umkristallisierte Produkt zeigte einen Smp. von 143° . Ein Mischschmelzpunkt mit reinem Dianisylketon zeigte keine Erniedrigung. —

177,0 mg des Ba-Sulfonats wurden in der üblichen Weise in das Na-Salz übergeführt, mit KMnO_4 oxydiert, und das mit BaCl_2 quantitativ gefällte BaSO_4 zur Wägung gebracht. Die Analyse zeigte daß die Sulfogruppe an der Äthylenbindung durch Oxydation zum Keton abgespalten wurde. — Dieselbe BaSO_4 -Fällung mit BaCl_2 wurde auch durch Oxydation mit Chromsäure qualitativ durchgeführt.

Analyse: 177,0 mg Subst. · 48,25 mg BaSO_4

Ber. für 1 Sulfogruppe: 16,20% Ba Gef. 16,04%

b) Ba-Salz der Disulfosäure:




Dianisyläthylen wird unter gleichen Bedingungen wie unter a) mit Oleum behandelt. Man läßt die intensiv kirschrote Lösung acht Tage stehen, bis sie eine wenig intensiv braune Färbung angenommen hat. Nach der Behandlung mit BaCO_3 , filtrieren usw. scheidet sich in der Kälte nur noch eine geringe Menge des Monosulfonats aus. Es wird nach 48 Std. abfiltriert, das Filtrat auf 5 ccm eingengt und mit 50 ccm absolutem Alkohol versetzt. Der sich nach einiger Zeit absetzende geringe farblose Niederschlag wird abfiltriert und bei 140° getrocknet. Die geringe Substanzmenge ließ keine

genaue Kristallwasserbestimmung zu. Das Salz ist in Wasser leicht löslich; die wässrige Lösung zeigt Schaumwirkung. Eine abgewogene Menge des kristallwasserfreien Produktes wird in der Hitze mit verd. H_2SO_4 versetzt und das ausfallende BaSO_4 nach der üblichen analytischen Methode bestimmt.

Analyse: 26,04 mg Subst. 11,52 mg BaSO_4

$\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_8\text{S}_2\text{Ba}$: Ber. 25,65% Ba Gef. 26,03%

c) Ba-Salz der Trisulfosäure:



Dianisyläthylen wird zunächst, wie unter b) beschrieben, mit Oleum behandelt. Die braune Lösung wird nochmals mit der gleichen Menge 20%igem Oleum 2 Std. auf 100° erwärmt. Nach 48-stündigem Stehen wird nach den unter a) und b) gemachten Angaben das Mono- und Disulfonat abgetrennt. Das alkoholische Filtrat wird mit Wasser versetzt und auf dem Wasserbad vom Alkohol befreit. Die gelb gefärbte Lösung wird eingengt und im Vakuum-exsiccator der Kristallisation überlassen. Nach einigen Tagen ist das Salz zu einer harten Kristallmasse mit konstantem Wassergehalt erstarrt. Die Substanz zeigt rote Halochromie. Sie löst sich leicht in kaltem Wasser. Die wässrige Lösung schäumt beim Schütteln stark.

Analyse: 123,0 mg Subst. 16,90 mg Trockenverlust

36,3 mg Subst. 32,85 mg CO_2 11,10 mg H_2O

152,0 mg Subst. 66,41 mg BaSO_4

112,0 mg Subst. 97,83 mg BaSO_4 (Carius)

$\text{C}_{32}\text{H}_{30}\text{O}_{22}\text{S}_6\text{Ba}_3 + 12 \text{H}_2\text{O}$:

Ber. 24,20% C Gef. 24,68%

3,43% H 3,42%

25,97% Ba 25,71%

12,12% S 12,00%

13,63% H_2O 13,67%

Methoxylbestimmung: Nach einer von Kirpal und Bühn (B. 47, 1084 [1914]) angegebenen Methode wurden ca. 0,2 g des Ba-Salzes feingepulvert mit 2 g Jodwasserstoffsäure und 20 ccm Eisessig in einem Rundkölbchen eine Stunde erhitzt. Die entstehenden Jodmethyldämpfe wurden in einer Vorlage (Doppelkölbchen), das mit ca. 10 ccm Pyridin beschickt war, aufgefangen. Die gebildete gelbe Lösung von Pyridinjodmethylat wurde nach dem Erkalten mit Wasser quantitativ aus der Vorlage in ein Becherglas gebracht und die wässrige Lösung auf dem Wasserbad bis zur Trockene eingedampft. Es wurde mit Wasser aufgenommen und mit $n/10$ AgNO₃ gegen Kaliumchromat bis zur Rotfärbung titriert (1 ccm $1/10$ n AgNO₃ = 0,0031 g OCH₃).

201,1 mg Subst. 5,30 ccm $n/10$ AgNO₃

$C_{32}H_{30}O_{22}S_6Ba_3 + 12H_2O$:

Ber. 8,02% OCH₃ Gef. 8,17%

Oxydativer Abbau: 2 g des Ba-Salzes wurden in heißer wässriger Lösung mit Soda in geringem Überschuß versetzt. Das BaCO₃ wurde abfiltriert und mit siedendem Wasser ausgewaschen. Das zur Trockene eingedampfte Filtrat wurde unter Rückfluß mit einer essigsäuren Lösung von 2 g Chromsäure solange erhitzt, bis die Lösung die reine Chromisalzfarbe angenommen hatte. Nach dem Erkalten wurde in ca. 500 ccm Wasser gegeben. Zur klaren Lösung wurden 2 ccm konz. Schwefelsäure zugesetzt und auf dem Wasserbad auf ca. 5 ccm eingengt. Neben einer Kristallmasse aus rein anorganischen Bestandteilen lag eine wenig intensiv grün gefärbte Lösung von öligler Konsistenz vor. In der Kälte wurde mit abs. Alkohol ausgezogen und von den anorganischen Bestandteilen (Cr₂(SO₄)₃, Na₂SO₄) abfiltriert. Das alkoholische Filtrat wurde mit Wasser versetzt und der Alkohol abgedampft. Die saure wässrige Lösung wurde in der Siedehitze mit BaCO₃ neutralisiert und siedend heiß vom BaSO₄ abgesaugt. Aus dem stark eingengten Filtrat kristallisierte das Ba-Salz der Dianisylketon-disulfosäure in farblosen Blättchen. Es wurde aus Wasser umkristallisiert.

Analyse: 118,6 mg Subst. 14,10 mg Trockenverlust.

29,14 mg Subst. 31,25 mg CO₂ 9,15 mg H₂O


11,10 mg BaSO₄



Ber. 29,43 % C	Gef. 29,25 %
3,62 % H	3,51 %
22,46 % Ba	22,42 %
11,78 % H ₂ O	11,89 %

12. Sulfonierung des Dimethylaminodiphenyläthylens.

a) Monosulfosäure:



4,5 g (1/50 Mol) Äthylen werden in feingepulverter Form in kleinen Portionen in 20 g 12%iges Oleum (ca. 1/5 Mol) unter stetem Rühren eingetragen. Die Temperatur soll 50° nicht übersteigen. Nach beendeter Zugabe erhitzt man kurz auf 80°, läßt 24 Std. stehen und gibt in Eiswasser. Die klare, wenig intensiv braun gefärbte Lösung wird siedend heiß mit einer wässrigen Aufschlämmung von BaCO₃ versetzt. Im Augenblick der Neutralisation tritt deutlicher Farbumschlag nach intensiv orange ein. Es wird siedend heiß vom BaSO₄ abgesaugt, gut mit heißem Wasser gewaschen und das rotorange gefärbte Filtrat auf dem Wasserbad bis zur beginnenden Kristallisation eingengt. In der Kälte bildet sich ein feinkörniger gelber Niederschlag, der von der orangeroten Mutterlauge abfiltriert wird. Durch Umkristallisieren aus verdünntem Alkohol erhält man gelbe Kristalle vom Smp. 89—90°.

Löslichkeitsverhältnisse:


Wasser: löslich Äther: unlöslich Alkohol: löslich
Benzol: löslich Aceton: löslich Eisessig: gelb löslich
conc. H₂SO₄: gelbe Halochromie.

Analyse: 52,44 mg Subst. 2,94 mg Trockenverlust
28,12 mg Subst. 61,60 mg CO₂ 15,04 mg H₂O
C₁₆H₁₇O₃NS + H₂O:

Ber. 59,77% C	Gef. 59,74%
5,96% H	5,98%
5,61% H ₂ O	5,61%

Oxydativer Abbau: Eine Probe der Sulfosäure wurde mit einem geringen Überschuß der berechneten Menge Soda aufgekocht. Die Lösung des entstehenden Na-Salzes war grünlichgelb. Man gab bei Wasserbadtemperatur tropfenweise KMnO₄ zu, filtrierte am Ende vom MnO₂ ab und säuerte an. Bei Zugabe von BaCl₂ blieb die Lösung klar. Die Sulfogruppe befand sich also nicht in der Seitenkette sondern in einem der Benzolringe.

b) Ba-Monosulfonat des Sulfons:



Das unter a) erhaltene orangerote Filtrat wird eingengt und im Vakuumexsiccator der Kristallisation überlassen. Die Substanz erstarrt zu einer harten Kristallmasse, die trotz mehrfachen Umkristallisierens keine eindeutigen Analysendaten ergibt.

Das Salz wird in feingepulverter Form 24 Std. im Soxleth mit abs. Alkohol behandelt. Man erhält als Rückstand ein orangefarbenes Salz, während das Filtrat rot ist. Das Salz wird nach gründlichem Waschen mit abs. Alkohol und Trocknen auf Ton aus Wasser umkristallisiert. Die Substanz kristallisiert schlecht. Nach dem Eindampfen bis zur sirupartigen Konsistenz erstarrt sie im Vakuumexsiccator und hat nach mehreren Tagen einen konst. Wassergehalt angenommen.

Analyse: 228,7 mg Subst.	17,4 mg Trockenverlust
37,85 mg Subst.	56,50 mg CO ₂ 13,26 mg H ₂ O
	9,42 mg BaSO ₄
45,68 mg Subst.	1,22 ccm/24 ⁰ /759 mm N




Ber. 40,94% C	Gef. 40,71%
3,87% H	3,92%
2,99% N	3,07%
14,65% Ba	14,65%
7,68% H ₂ O	7,61%

Oxydativer Abbau: Das Ba-Salz wurde mit Soda in das entsprechende Na-Salz übergeführt und bei Wasserbadtemperatur mit KMnO_4 behandelt. Das angesäuerte, klar gelbe Filtrat schied in der Kälte einen gelben Niederschlag aus, der sich in konz. Salzsäure löste. Nach 24 Std. wurde der feinkristalline Niederschlag filtriert, auf Ton getrocknet und aus verdünntem Alkohol umkristallisiert. Die geringe Substanzmenge ließ eine genaue Wasserbestimmung nicht zu. Das Salz wurde bei 150° getrocknet und wasserfrei zur Analyse gebracht.

Analyse: 37,62 mg Subst.	54,73 mg CO_2
	8,95 mg H_2O
	9,68 mg BaSO_4

$\text{C}_{30}\text{H}_{24}\text{O}_{12}\text{N}_2\text{S}_4\text{Ba}:$	Ber. 39,74% C	Gef. 39,68%
	2,67% H	2,66%
	15,16% Ba	15,14%

c) Ba-Salz der Disulfosäure:



Das rote alkoholische Filtrat des unter b) erhaltenen Salzes scheidet beim Abkühlen noch eine geringe Menge des Sulfons aus. Das klare Filtrat hinterläßt nach dem Einengen schöne rote Kristallflitter.


Analyse: 50,60 mg Subst.	4,77 mg Trockenverlust
32,51 mg Subst.	38,80 mg CO ₂ 11,62 mg H ₂ O
	12,83 mg BaSO ₄



Ber.	32,62 % C	Gef.	32,55 %
	3,94 % H		4,00 %
	23,33 % Ba		23,22 %
	12,24 % H ₂ O		12,20 %

Oxydativer Abbau: Das Ba-Salz wurde wie üblich in das Na-Salz umgewandelt und dann mit KMnO_4 nach den bekannten Vorschriften oxydiert. Die salzsaure orange gefärbte Lösung des erhaltenen Ketons blieb bei Zusatz von BaCl_2 klar. Die Sulfonierung kann also nur in den Benzolkernen nicht aber in der Seitenkette stattgefunden haben.

d) Sulfon:



Der unter a) erhaltene BaSO_4 -Niederschlag bleibt nach wiederholtem gründlichen Auswaschen mit siedendem Wasser gelb gefärbt. Es wird mit heißem abs. Alkohol ausgezogen. In der Kälte kristallisieren aus der alkoholischen Lösung gut ausgebildete grüngelbe Prismen, die nach einmaligem Umkristallisieren aus Methylalkohol einen konst. Smp. von 178° aufweisen.


Löslichkeitsverhältnisse:

Wasser: unlöslich Alkohol: heiß löslich Aceton: löslich
 Äther: unlöslich Benzol: heiß löslich Eisessig: gelb löslich
 conc. H_2SO_4 : gelbe Halochromie.

Analyse:	22,86 mg Subst.	56,18 mg CO_2	10,86 mg H_2O
	23,04 mg Subst.	1,00 ccm/25°/760 mm N	
$\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{NS}$:	Ber.	67,33 % C	Gef. 67,02 %
		5,30 % H	5,32 %
		4,91 % N	4,96 %

13. Sulfonierung des Tetramethyldiaminodiphenyläthylens.

a) Ba-Salz der Monosulfosäure:



In 20 ccm 15 %-iges Oleum gibt man solange feingepulvertes Tetramethyldiaminodiphenyläthylen in kleinen Portionen, bis unter dauerndem Turbinieren kein freies SO_3 mehr entwickelt wird. Wenn die Temperatur 50° nicht übersteigt, können auf diese Weise ca. 5 g in die Schwefelsäure eingetragen werden. Man gibt nach 24 Stunden die braungelb gefärbte klare Lösung in Eiswasser. Augenblicklich tritt Farbumschlag nach intensiv grün ein. In der Siedehitze wird mit BaCO_3 neutralisiert. Kurz vor Eintritt der Neutralisation wird Farbumschlag nach blau beobachtet. Bei völliger Neutralisation und Kochtemperatur geht die Intensität stark zurück. Es wird heiß vom BaSO_4 filtriert und gut mit kochendem Wasser gewaschen. Beim Abkühlen scheidet sich im schwach blaugrün gefärbten Filtrat eine farblose Kristallmasse ab. Nach dem Umkristallisieren aus kochendem Wasser unter Zusatz eines Tropfens Ammoniak gewinnt man farblose Blättchen, die sich an der Luft allmählich blau anfärben. Das Salz verkohlt oberhalb 300° . Es ist unlöslich in kaltem, schwer löslich in heißem Wasser. Mit konz. Schwefelsäure gibt es gelbe, mit Eisessig grünstichig blaue Halochromie.

Analyse: 218,2 mg Subst. 9,12 mg Trockenverlust.

33,14 mg Subst. 60,65 mg CO_2 15,85 mg H_2O
8,95 mg BaSO_4

38,29 mg Subst. 2,16 ccm/22°/753 mm N

$\text{C}_{36}\text{H}_{42}\text{O}_6\text{N}_4\text{S}_2\text{Ba} + 2 \text{H}_2\text{O}$:


Ber. 50,01% C	Gef. 49,91%
5,37% H	5,35%
6,48% N	6,45%
15,90% Ba	15,89%
4,17% H_2O	4,18%

Oxydativer Abbau: Eine gewogene Menge des Ba-Salzes wurde in üblicher Weise in das Na-Salz übergeführt und dann mit KMnO_4 oxydiert. Es wurde quantitativ vom MnO_2 filtriert und mit Wasser gut ausgewaschen. Der nach dem Ansäuern mit BaCl_2 gefällte BaSO_4 -Niederschlag wurde zur Wägung gebracht. — Der abfiltrierte MaO_2 -Niederschlag wurde nach dem Trocknen mit Benzol ausgezogen. Nach dem Abdampfen des Benzols wurde eine schwach grün gefärbte Kristallmasse, nach dem Umkristallisieren aus Alkohol farblose Nadelchen vom Smp. 173° erhalten. Ein Mischschmelzpunkt mit reinem Michler'schen Keton zeigte keine Depression.

Analyse: 106,4 mg Subst. 18,2 mg BaSO_4

Ber. für 1 Sulfogruppe: 15,90% Ba Gef. 15,60%

b) Disulfosäure:



Unter den gleichen, in a) angegebenen Bedingungen wird Tetramethyldiaminodiphenyläthylen mit Oleum behandelt. Man läßt die orange gefärbte Lösung etwa acht Tage bei Zimmertemperatur stehen, bis eine Probe in Wasser mit rein gelber Farbe gelöst wird. (Noch nach 3—4 Tagen ist die wässrige Lösung in der Durchsicht grün, in der Aufsicht braungelb.) Danach gibt man in ca. 200 ccm Wasser. Nach dreiwöchigem Stehen haben sich gut ausgebildete, orangefarbene Kristalle abgeschieden. Die Substanz hat keinen Schmelzpunkt. Sie wird bei 150° gelb, bei ca. 175° grün und verkohlt oberhalb 230° . Die Substanz ist gegen alkoholisches Kali bei Kochtemperatur beständig.

Löslichkeitsverhältnisse:

Wasser: heiß schwer löslich Benzol: unlöslich Alkohol:
 heiß löslich Eisessig: heiß grün löslich Äther: unlöslich
 conc. H_2SO_4 : gelbe Halochromie.

Analyse: 44,04 mg Subst. 3,43 mg Trockenverlust

21,08 mg Subst. 36,13 mg CO_2 10,68 mg H_2O

37,36 mg Subst. 1,94 ccm/23⁰/759 mm N
 $C_{18}H_{22}O_6N_2S_2 + 2 H_2O:$

Ber. 46,72% C	Gef. 46,73%
5,57% H	5,67%
6,06% N	5,96%
7,79% H ₂ O	7,79%

14. Fischer-Base und Oleum.

3,3 g Fischer-Base (1/50 Mol) wurden tropfenweise unter mechanischem Rühren und Eis-Kochsalz-Außenkühlung zu ca. 20 g 10%igem Oleum (ca. 1/5 Mol) gegeben. Nach beendeter Zugabe wurde noch 30 Min. turbiniert. Nach dreitägigem Stehen wurde die klare, wenig intensiv braungelb gefärbte Lösung auf Eis gegossen und mit BaCO₃ versetzt. Noch bevor der Neutralpunkt erreicht war, trat quantitative Rückbildung von Fischer-Base ein! — Da auch auf andere Weise (Backprozeß, NaHSO₄-Schmelze) eine Darstellung eines Ba-Sulfonates nicht gelang, wird angenommen, daß in der schwefelsauren Lösung das Sulfat der Fischer-Base vorgelegen hat, das analog dem Chlorhydrat (vgl. S. 26) sehr leicht wasserlöslich, farblos und alkaliunbeständig ist.

C. Umsetzungen der Äthylene mit Monohydrat (100%ig) und conc. Schwefelsäure (96%ig).

15. Diphenyläthylen und Monohydrat.

Diphenyläthylen wurde in überschüssiger conc. Schwefelsäure unter Turbinieren und schwacher Erwärmung (50—60°) zur Lösung gebracht. Beim Eingießen der klaren, gelblichen, grün fluoreszierenden Lösung in Eiswasser trat sofortige Entfärbung ein. Eine stark milchige Trübung setzte sich nach stundenlangem Stehen als Niederschlag ab und wurde durch Schmelzpunkt und Mischschmelzpunkt als das auf S. 32/33 beschriebene Dimerisationsprodukt identifiziert. Mehrtägiges Stehen der schwefelsauren Lösung hatte auf den Reaktionsverlauf kaum Einfluß. Wohl erwies sich beim Eingießen in Eiswasser die entstehende Trübung als geringer, doch konnte auch wochenlanges Stehen sie nicht vollständig vermeiden. — Die Sulfonierung mit Monohydrat verlief nach vorsichtigem Eingeben des

Äthylens in der Kälte und nachherigem Erhitzen auf 120—150° analog der Sulfonierung mit Oleum. Es konnte auch auf diesem Wege die auf S. 33 beschriebene Sulfosäure dargestellt und als Ba-Salz isoliert werden. Die Anwendung von Temperaturen über 180° hatten allmähliche Verkohlung zur Folge.

16. Anisylphenyläthylen und Monohydrat.

Anisylphenyläthylen gab mit konz. Schwefelsäure und mit Monohydrat weder ein Dimerisationsprodukt, noch trat Sulfonierung ein. Beim Eingießen der klaren, schwefelsauren, orange gefärbten Lösung trat auch bei Anwendung höherer Temperaturen (bis 150°) ein mehr oder weniger starker Niederschlag auf, der nach dem Umkristallisieren aus Alkohol als unzersetztes Äthylen (Smp. 75°) erkannt wurde.

17. Dianisyläthylen und Monohydrat.

Dianisyläthylen zeigte mit conc. Schwefelsäure sowie mit Monohydrat intensiv orangefarbene Halochromie. Beim Eingeben der schwefelsauren Lösung in Eiswasser trat augenblicklich Entfärbung und fast quantitative Abscheidung des Ausgangsmaterials ein. Eine Sulfonierung fand also höchstens in geringem Umfang statt.

18. Dimethylaminodiphenyläthylen und Monohydrat.

Dimethylaminodiphenyläthylen verhielt sich durchaus analog den oben beschriebenen Äthylenen. Es nahm in der konz. Säure zunächst eine rotbraune Färbung an, die in größerer Konzentration oliv erschien. Beim Verdünnen mit Wasser schied sich unverändertes Äthylen aus.

19. Tetramethyldiaminodiphenyläthylen und Monohydrat.

Aus Tetramethyldiaminodiphenyläthylen und Monohydrat wurde, allerdings in sehr geringer Ausbeute, das auf S. 45 beschriebene Ba-Salz der Monosulfosäure erhalten. Die Hauptmenge des Äthylens blieb unverändert.


20. Fischer-Base und Monohydrat.

Fischer-Base löste sich in konz. Schwefelsäure klar mit gelb-

oranger Farbe. Beim Abstumpfen der Säure trat quantitativer Zerfall in die freie Base ein. Es hatte sich also nur das Sulfat gebildet.

D. Umsetzungen der Äthylene mit N-Pyridinsulfosäure.

21. Diphenyläthylen- β -sulfosäure (Ba-Salz):




3,6 g Äthylen (1/50 Mol) und 3,2 g N-Pyridinsulfosäure (1/50 Mol) werden bei ca. 120° zusammengeschmolzen. Nach etwa 1 Std. ist das Pyridin abdestilliert und durch Geruch nicht mehr wahrnehmbar. Die erkaltete Schmelze wird klar in Wasser gelöst. Man neutralisiert mit BaCO₃, filtriert und dampft bis zur beginnenden Kristallisation ein. Aus Wasser umkristallisiert, erhält man feine farblose Nadelchen, unlöslich in organischen Lösungsmitteln. Halochromie mit konz. Schwefelsäure: orange. — Eine Substanzprobe wurde mit KMnO₄ oxydativ abgebaut. Im angesäuerten Filtrat ließen sich SO₄-Jonen nachweisen. Die Sulfonierung hat demnach in der Seitenkette stattgefunden.

Analyse: 40,35 mg Subst. 2,11 mg Trockenverlust
16,48 mg Subst. 29,19 mg CO₂ 5,27 mg H₂O
5,50 mg BaSO₄

C₂₈H₂₂O₆S₄Ba + 2 H₂O:

Ber. 48,58% C	Gef. 48,31%
3,79% H	3,58%
19,86% Ba	19,64%
5,21% H ₂ O	5,23%

22. Anisylphenyläthylen- β -sulfosäure (Ba-Salz):




Äthylen und N-Pyridinsulfosäure werden im molaren Verhältnis unter den in 21 angegebenen Bedingungen verschmolzen. Es wird ein farbloses Ba-Salz erhalten, das in glänzenden Blättchen kristallisiert. Halochromie mit konz. Schwefelsäure: orange. — Eine Probe der Substanz wurde mit KMnO_4 in sodaalkalischer Lösung oxydativ abgebaut. In der mit Salzsäure angesäuerten Lösung waren nach der Oxydation SO_4 -Ionen nachzuweisen.

Analyse: 143,2 mg Subst. 6,90 mg Trockenverlust
 30,95 mg Subst. 54,33 mg CO_2 11,30 mg H_2O
 9,61 mg BaSO_4



Ber. 47,89% C	Gef. 47,88%
4,02% H	4,08%
18,27% Ba	18,27%
4,79% H_2O	4,82%

23. Dianisyläthylen- β -sulfosäure (Ba-Salz):



Dianisyläthylen wird unter den gleichen Bedingungen wie in 21 beschrieben mit der äquivalenten Menge N-Pyridinsulfosäure bei 120° verschmolzen und die wässrige Lösung der Schmelze mit BaCO_3 zum Ba-Sulfonat aufgearbeitet. Das erhaltene Salz ist identisch mit dem aus Oleum dargestellten, auf S. 37 beschriebenen Ba-Monosulfonat. Ein oxydativer Abbau wurde mit dem gleichen Ergebnis durchgeführt.

Analyse: 26,43 mg Subst. 43,76 mg CO_2 10,71 mg H_2O
 7,27 mg BaSO_4



Ber. 45,30% C	Gef. 45,16%
4,52% H	4,53%
16,20% Ba	16,20%

24. Versuche, Diphenyl-, Anisylphenyl- und Dianisyläthylen mit N-Pyridinsulfosäure in CCl_4 , CHCl_3 und Nitrobenzol sowie


anderen organischen Lösungsmitteln zur Reaktion zu bringen, mißlingen. In den meisten Fällen konnte das Ausgangsäthylen quantitativ zurückgewonnen werden.

25. Dimethylaminodiphenyläthylen und Tetramethyldiaminodiphenyläthylen wurden in molarem Verhältnis mit N-Pyridinsulfosäure bei 120° verschmolzen. Neben viel harzigen, teils verkohlten Produkten konnten Umsetzungsprodukte in reiner Form nicht gefaßt werden.

26. 2,2 g (1/100 Mol) Dimethylaminodiphenyläthylen wurden in 10 ccm Nitrobenzol gelöst und unter Zusatz von 3,2 g (1/50 Mol) N-Pyridinsulfosäure mehrere Stunden erhitzt. In der Kälte kristallisierten aus der wenig intensiv braunen Lösung schwachgelb gefärbte Nadelchen. Nach dem Umkristallisieren aus Alkohol war die Substanz farblos. Smp. 108—110°. Die Konstitution dieser Verbindung zu ermitteln, ist bisher nicht gelungen (Substanzmangel). Vielleicht liegt ein Anlagerungsprodukt von Pyridin-SO₃ und Dimethylaminodiphenyläthylen vor; denn die Verbindung läßt sich leicht in Pyridin, Äthylen und Schwefelsäure aufspalten.

27. 2,7 g Tetramethyldiaminodiphenyläthylen und 3,2 g N-Pyridinsulfosäure wurden in Nitrobenzol zusammengebracht. Fast augenblicklich trat Lösung, verbunden mit intensiver Grünfärbung ein. Bisher gelang es nicht, ein definiertes Produkt zu fassen.

28. Fischer-Base und N-Pyridinsulfosäure:



1,7 g (1/100 Mol) Fischer-Base und 3,2 g (1/50 Mol) N-Pyridinsulfosäure werden in wenig Nitrobenzol 6 Std. auf dem Wasserbad erhitzt. Aus der intensiv roten Lösung scheidet sich in der Kälte ein in Nadelchen kristallisierender Körper aus. Das zunächst rot gefärbte Salz wird mit Benzol gewaschen und aus verdünntem Alkohol umkristallisiert. Man erhält farblose Nadelchen vom Smp.

206° u. Zers. Das Produkt ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, unlöslich in Benzol. Mit konz. Schwefelsäure gibt es schwach gelbe Halochromie. BaCl_2 erzeugt einen in Wasser unlöslichen Niederschlag, löslich in heißer Salzsäure. Mit festem Ätzkali verrieben, bildet sich die freie Fischer-Base zurück (allmähliche Rotfärbung); ebenfalls tritt beim Kochen mit Sodalösung der typische Geruch nach Fischer-Base auf.

Analyse: 65,55 mg Subst. 4,36 mg Trockenverlust
 24,45 mg Subst. 47,46 mg CO_2 13,84 mg H_2O
 37,83 mg Subst. 1,70 ccm/25°/759 mm N
 $\text{C}_{12}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{NS} + \text{H}_2\text{O}$:

Ber. 53,10% C	Gef. 52,94%
6,32% H	6,33%
5,16% N	5,13%
6,64% H_2O	6,65%

E. Umsetzungen der Äthylene mit p-Toluolsulfochlorid.

29. Diphenyl-, Anisylphenyl- und Dianisyläthylen wurden mit p-Toluolsulfochlorid in benzolischer Lösung tagelang erhitzt. Eine Reaktion fand nicht statt. Nach dem Erkalten kristallisierte das Äthylen unverändert wieder aus.

30. Dimethylaminodiphenyläthylen und p-Toluolsulfochlorid wurden in molarem Verhältnis zusammengebracht. Nach längerem Erhitzen in benzolischer Lösung trat wohl eine braunrote Lösungsfarbe auf, ein Umsatz in größerem Umfange konnte jedoch nicht festgestellt werden.

31. 5,32 g Tetramethyldiaminodiphenyläthylen (1/50 Mol) wurden in wenig Benzol gelöst und mit einer benzolischen Lösung von 1,90 g p-Toluolsulfochlorid (1/100 Mol) in der Kälte versetzt. Erst nach mehrstündigem Erhitzen unter Rückfluß trat intensive Grünfärbung und Abscheidung eines farblosen Salzes ein.

Das farblose Salz konnte nach dem Waschen mit Benzol und Umkristallisieren aus Amylalkohol als das doppelte Chlorhydrat des Äthylens identifiziert werden. (Smp. 207—208°). (Vergl. Theoret. Teil S. 26).

Die intensive grüne Lösung erwies sich als sehr unbeständig. Ein kristallines Produkt konnte bisher nicht gefaßt werden. Beim Eindampfen im Vakuum entstand eine zähflüssige Masse, unlöslich in Wasser und Ligroin, löslich in Alkohol, Aceton, Eisessig und Chloroform.

32. Fischer-Base und p-Toluolsulfochlorid.

3,46 g Fischer-Base (1/50 Mol) wurden mit einer benzolischen Lösung von 1,90 g p-Toluolsulfochlorid (1/100 Mol) versetzt. Nach kurzem Erhitzen unter Rückfluß auf dem Wasserbad trat Salzabscheidung mit gleichzeitiger Farbintensivierung und -vertiefung nach violettrot auf. Nach ca. 4 Std. wurde heiß filtriert und mit wenig Benzol nachgewaschen. Beim Abkühlen des Filtrats trat noch geringe Nachkristallisation auf.

Das farblose Salz wurde mit Aceton und Äther behandelt und aus Amylalkohol umkristallisiert. Es erwies sich als das Chlorhydrat der Fischer-Base und war mit dem aus Fischer-Base und Salzsäure dargestellten Produkt identisch. Smp. 223° . (Vergl. Theor. Teil S. 26.) Das Salz ist sehr hygroskopisch und hält sich nur im Vakuumexsiccator über Schwefelsäure.

Trotz wochenlangem Stehen, Eindampfen im Vakuum, Lösen in den verschiedensten organischen Lösungsmitteln und Versuchen, mit Äther, Alkohol, Ligroin, Wasser u. a. m. umzufällen, wurde bisher aus der sehr intensiven violettroten Lösung kein kristallines Produkt erhalten. Die im Vakuum eingedampfte zähflüssige Masse ist unlöslich in Wasser und Ligroin, löslich in Alkohol, Aceton, Benzol, Chloroform und Eisessig. Mit Alkali und Mineralsäuren tritt sofortige Zersetzung ein.

Lebenslauf.

Am 9. März 1914 wurde ich, Herbert Günther als Sohn des Kaufmanns Max Günther und seiner Ehefrau Else, geb. Morsblech, in Wuppertal-Elberfeld geboren. Ich bin arischer Abstammung und evangelischer Konfession.

Ich besuchte drei Jahre die Grundschule und neun Jahre das staatliche Hindenburg-Realgymnasium in Elberfeld, das ich Ostern 1932 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Vom S.S. 1932 bis S.S. 1934 studierte ich in Marburg Chemie und legte dort das 1. Verbandsexamen ab. Das 2. Verbandsexamen bestand ich in Bonn Ende des S. S. 1935. Im W. S. 1935/36 begann ich vorliegende Arbeit, deren experimenteller Teil im Juni 1937 abgeschlossen wurde.

Von April 1936 bis März 1937 war ich als Unterrichts- und Vorlesungsassistent an der Höheren Fachschule für Textilindustrie, Abt. Färberei, in Wuppertal-Barmen tätig. Im S. S. 1937 war ich Hilfsassistent in der technologischen Abteilung des Chemischen Institutes Bonn.

Tag der mündlichen Prüfung: 10. September 1937.

